

近期常見問題（附常用熱線及有用連結）

（一） 近期常見問題

接種新冠疫苗		
1	我可否接種復必泰二價疫苗？	<p>對於免疫力正常人士，復必泰二價疫苗可作為 18 歲或以上人士的第 3 劑至第 5 劑疫苗（或康復人士的第 2 劑至第 4 劑疫苗）的另一選擇。但他們仍可選擇接種科興或復必泰原始病毒株疫苗。</p> <p>詳情(包括免疫力弱人士接種安排)可參閱「我應接種多少劑新冠疫苗」網頁： www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/recommendedDoses</p>
2	我可否接種第 5 劑新冠疫苗？	<p>18 歲或以上人士如已完成接種 4 劑疫苗（或已接種第 3 劑及曾受感染）並超過半年，可在知情同意下，於完成最後一次接種或康復 6 個月後（以較後時間者為準），選擇接種額外一劑疫苗（即未曾染疫人士的第 5 劑或曾受感染人士的第 4 劑）作加強保護。已接種 4 劑疫苗超過 14 日後染疫的人士，現時並未建議再接種疫苗。</p> <p>相關做法也適用於 18 歲或以上免疫力弱人士，而相關接種間距可縮短至 3 個月。</p> <p>有關人士可選擇科興、復必泰原始病毒株或復必泰二價疫苗。</p> <p>詳情可參閱「我應接種多少劑新冠疫苗」網頁： www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/recommendedDoses</p>

3	感染後需要接種多少劑？	<p>康復後接種疫苗之時間需視乎接種與康復的間隔及接種人士年齡等因素決定，請瀏覽「曾感染 2019 冠狀病毒病人士接種新冠疫苗須知」：</p> <p>www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_CHI.pdf</p> <p>詳情可參閱「我應接種多少劑新冠疫苗」網頁：</p> <p>www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/recommendedDoses</p>
4	接種後未夠 14 天受到感染，可減少接種一劑疫苗嗎？	<p>一般來說，曾感染 2019 冠狀病毒的人士所需接種的劑數會較一般公眾人士少一劑。為了發揮疫苗最好的效果及提升接種疫苗後的免疫反應，疫苗和感染 2019 冠狀病毒病之間需要有最少 14 天的間距。</p> <p>若疫苗接種與感染相隔不足 14 天者，不能因是次感染而減少接種一劑疫苗，疫苗接種紀錄仍會顯示感染前及康復後累計的疫苗接種資料。</p>
5	我感染了兩次，是否減少接種兩劑疫苗？	<p>一般來說，曾感染 2019 冠狀病毒的人士所需接種的劑數會較一般公眾人士少一劑。多次感染 2019 冠狀病毒的人士所需接種的劑數亦只較一般公眾人士少一劑。</p> <p>因此如果曾經兩次感染，不會被視作為已完成兩劑疫苗。</p> <p>有關康復者接種詳情，請瀏覽「曾感染 2019 冠狀病毒病人士接種新冠疫苗須知」：</p> <p>www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_CHI.pdf</p>

抵港人士

6	我抵港隨後 5 天，可否離開香港？	<p>有關人士並不受限制離開香港。</p> <p>政府仍建議所有抵港人士抵港後，在抵港當天（即第 0 天）至抵港後第 5 天期間，繼續每天以自備的快速抗原測試包進行快速抗原測試。相關人士可登入「2019 冠狀病毒病電子監察系統」，上載快速抗原檢測結果及健康狀況。</p>
---	-------------------	---

(二) 常用熱線

以下熱線每天為市民提供服務:

衛生防護中心熱線	
1830 111 (上午 9 時至晚上 8 時)	有關新冠疫情的一般查詢
醫管局支援熱線	
1836 115 (上午 9 時至下午 5 時)	解答感染人士醫療查詢

(三) 有用連結

建議疫苗接種劑次及間距：	https://www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/recommendedDoses
為感染人士提供醫療服務的私家醫院：	https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_ph_TC.pdf
已在醫健通登記並取得新冠口服藥物作治療的私家醫生：	https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf

更新日期：15.3.2023