

注意: 一般而言，除非已諮詢醫護專業人士意見，否則不應同時服用西藥和中藥。

撲熱息痛 (對乙酰氨基酚，Paracetamol) 500 毫克

此資訊單張並不是產品說明書，以下資料供一般的使用說明。如有任何疑問，應先徵詢醫護人員的意見

成份

每粒藥片/丸含有撲熱息痛 (對乙酰氨基酚，Paracetamol) 500 毫克。

使用方法與服量

- 撲熱息痛用於止痛及退燒。此產品只供口服，可飽肚或空肚服用¹。
- 成人及 12 歲以上兒童：需要時每次服一粒，每 4 至 6 小時服一次，24 小時內不可服用超過四次。在沒有諮詢醫生的情況下，用於止痛，不可服食多於 5 天。用於退燒，不可服食多於 3 天。
- 6 至 12 歲兒童：需要時每次服半粒，每 4 至 6 小時服一次，24 小時內不可服用超過四次。在沒有諮詢醫生的情況下，用於止痛，不可服食多於 5 天。用於退燒，不可服食多於 3 天。

注意事項

- 對撲熱息痛成分敏感人士，請勿服用。
- 切勿同時服用其他含有撲熱息痛成分的藥物。
- 患有腎病、肝病²或正服用抗凝血藥 (例如：Warfarin「華法林」) 人士³於服用前，先徵詢醫護人員的意見。
- 切勿服食超過指定劑量，否則可嚴重影響肝功能⁴。

藥物儲存

- 請存放在陰涼乾燥處，避免陽光照射。請勿將藥物存放於兒童能接觸的地方。

2022 年 7 月 11 日

請注意，藥物撲熱息痛藥片屬政府派發的抗疫物資，供相關接收者使用，而不應作銷售(無論該銷售是否收費)用途，否則你可能已觸犯《藥劑業及毒藥條例》(第 138 章)有關非法售賣未經註冊藥劑製品的罪行，一經定罪，最高罰則為罰款 100,000 元及監禁兩年。

¹ NHS - Paracetamol for adults (4. How and when to take it) - <https://www.nhs.uk/medicines/paracetamol-for-adults/>

² Martindale: The Complete Drug Reference – Paracetamol (Precautions) - <https://www.medicinescomplete.com/#/content/martindale/2679-p?hspl=paracetamol>.

³ NHS - Paracetamol for adults (8. Cautions with other medicines) - <https://www.nhs.uk/medicines/paracetamol-for-adults/>

⁴ TGA - Paracetamol: Practitioner fact sheet – <https://www.tga.gov.au/alert/paracetamol-practitioner-fact-sheet>